

BAB V

KESIMPULAN DAN DARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran penggunaan asam mefenamat pada pengurangan rasa nyeri ibu pasca bersalin RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Responden yang paling banyak mengalami skala nyeri 1-3 dengan kategori skala nyeri ringan sebanyak 69 orang (97,18%) dan paling sedikit mengalami skala nyeri 4-6 dengan kategori nyeri sedang sebanyak 2 orang (2,82%).

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menambah referensi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengurangan rasa nyeri menggunakan asam mefenamat untuk pasca persalinan sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dan meminimiliasir risiko kesakitan pada ibu pasca bersalin

2. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai evaluasi dalam melakukan pemberian atau penggunaan asam mefenamat pada pengurangan rasa nyeri ibu pasca bersalin

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah wawasan terhadap pengembangan variabel penelitian pada asam mefenamat pada pengurangan rasa nyeri ibu pasca bersalin pervaginam dan *sectio caesarea*.