

ABSTRAK

RAIDA. Hubungan Paritas Dan Jarak Kehamilan Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Puskesmas Kelayan Timur Banjarmasin Tahun 2015. Dibimbing oleh SUSANTI SUHARTATI dan YAYUK PUJI LESTARI

Latar Belakang : Kekurangan Energi Kronis (KEK) merupakan keadaan status gizi kurang pada ibu hamil. Menurut Riskesdas 2013, Kalsel merupakan provinsi ketiga dengan prevalensi risiko KEK diatas nasional. KEK berdampak terhadap ibu dan calon bayi yang dikandungnya, antara lain perdarahan, BBLR dan kematian ibu dan janin. Paritas dan jarak kehamilan merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan KEK

Tujuan : Menganalisis hubungan antara paritas dan jarak kehamilan pada ibu hamil dengan kejadian KEK di Puskesmas Kelayan Timur Banjarmasin Tahun 2015

Metode : Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional*. Subjek penelitian ini adalah ibu hamil.

Hasil : Ibu hamil terbanyak dengan paritas primipara dan ibu hamil terbanyak adalah dengan jarak kehamilan > 2 tahun. Hasil analisis menyatakan ada hubungan antara paritas dengan KEK, namun tidak ada hubungan antara jarak kehamilan dengan KEK.

Simpulan : Ada hubungan antara paritas pada ibu hamil dengan kejadian KEK di Puskesmas Kelayan Timur Banjarmasin Tahun 2015 dan tidak ada hubungan antara jarak kehamilan pada ibu hamil dengan kejadian KEK di Puskesmas Kelayan Timur Banjarmasin Tahun 2015.

Kata Kunci : Kekurangan Energi Kronis (KEK), Paritas, Jarak Kehamilan