

**ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS DENGAN *RUPTURE PERINEUM*  
SPONTAN DERAJAT II DI RUANG NIFAS RSUD DR. H. MOCH ANSARI SALEH  
BANJARMASIN**

Yunesti Ani <sup>1\*</sup>, Dewi Pusparani Sinambela<sup>1</sup>, Filistea Winda Emilia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>AKBID Sari Mulia Banjarmasin

\*email: yunestiani98@gmail.com Telpon: 081719253532

**ABSTRAK**

**Latar belakang :** *Rupture perineum* spontan derajat II adalah perlukaan jalan lahir atau robekan *perineum* secara tidak sengaja. Berdasarkan data WHO tahun 2009 terjadi 2,7 juta kasus *rupture perineum* pada ibu bersalin. Angka perkiraan akan meningkat mencapai 6,3 juta pada tahun 2050 jika tidak mendapat penanganan yang lebih akibat perawatan *perineum* yang tidak benar dapat mengakibatkan kondisi *perineum* yang terkena lokhea menjadi lembab sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi.

**Tujuan :** Melaksanakan asuhan pada ibu nifas dengan *rupture perineum* spontan derajat II dengan menggunakan manajemen varney serta pendokumentasian secara metode SOAP

**Metode :** Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan tehnik pengumpulan data secara primer meliputi wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi serta data sekunder.

**Hasil :** Ibu nifas dengan *rupture perineum* spontan derajat II dilakukan perawatan kurang lebih 4 hari di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh, meliputi manajemen dengan mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital, perdarahan, dan perawatan luka jahitan. Setelah dilakukan evaluasi didapatkan hasil ibu tidak ada keluhan, keadaan umum ibu baik, luka jahitan sudah mengering. Kasus ibu nifas dengan *rupture perineum* spontan derajat II dapat ditangani dengan tepat.

**Simpulan :** Berdasarkan hasil asuhan Ny. R post partum hari ke-4 didapatkan hasil robekan *perineum* area jahitan mengering, tidak kemerahan, tidak ada pembengkakan dan jaringan mulai menyatu.

**Kata kunci :** Nifas, Perawatan Luka, *Rupture Perineum* Derajat II.